

じんましん、湿疹・かぶれ クロンパンシロップ

によるかゆみ、鼻炎に

第 2 類医薬品

★クロンパンシロップの特徴

アレルギー性鼻炎やじんましん、薬物疹等アレルギー性疾患はとてまかゆくて苦しいものです。

クロンパンシロップは、抗ヒスタミン剤として汎用されているクロルフェニラミンマレイン酸塩に、皮膚等を健康に保つビタミンでもあるリポフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)やピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)を合理的に配合しているため、じんましんや湿疹によるかゆみに効果があります。

本剤は黄色のシロップ剤です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。(眠気等があらわれることがあります。)
3. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人 排尿困難
 - (5) 次の診断を受けた人 緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、寒気、喉の痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
口のかわき、眠気
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

成分と作用

成 分	10 mL 中	作 用
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	汎用されている抗ヒスタミン剤です。
リポフラビンリン酸エステルナトリウム	10mg	ビタミンB ₂ とB ₆ で、皮膚や粘膜を健康に保ち、新陳代謝を高めます。
ピリドキシン塩酸塩	10mg	
カフェイン	50mg	抗ヒスタミン剤の副作用である眠気を防止し、心臓の働きを強めます。
パンテノール	30mg	体内の新陳代謝を高め、抗炎症作用を示します。
アルコール	0.3mL	血液の流れを速めます。

添加物として、塩化ナトリウム、ハチミツ、白糖、グルタミン酸ナトリウム、D-ソルビトール、DL-リンゴ酸、デヒドロ酢酸ナトリウム及び香料を含有します。

効能・効果

じんましん、湿疹・かぶれによるかゆみ、鼻炎

用法・用量

次の1回量を1日2回服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。

年 齢	成人(15歳以上)	8歳以上15歳未満	4歳以上8歳未満
1回量	1瓶	5 mL	3 mL

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (2) 本剤は4歳未満の幼児には服用させないで下さい。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限にかかわらず、開封後は速やかに服用して下さい。

★お問い合わせ先

日本薬品株式会社 お客様相談室
〒841-0032 佐賀県鳥栖市大正町 716
電話 0942-82-2029 FAX 0942-82-2036
受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



(14M)

製造販売元
日本薬品株式会社

佐賀県鳥栖市大正町 716