

2009年1月リスク区分表示追加しました。

この説明文書は服用前に必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

じんましん、湿疹によるかゆみに アレルギー用薬 **ベリール錠** 第2類医薬品

じんましん等の皮膚疾患をはじめとしたアレルギー性疾患は、抗原の刺激によって体内に遊離されたヒスタミン等の化学物質が原因となっており、外用剤だけでは治りにくい場合があります。

ベリール錠は飲んで効くアレルギー用薬で、アレルギー症状を抑える抗ヒスタミン剤のマレイン酸クロルフェニラミンや炎症を抑え、解毒を助ける働きのあるグリチルリチン酸二カリウムをはじめ、ビタミンやカルシウムが配合しており、じんましんや湿疹・かぶれによるかゆみ、鼻炎に効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気があらわれることがある。)
3. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、腎臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
口のかわき

効 能

じんましん、湿疹・かぶれによるかゆみ、鼻炎

用法・用量

次の量を、水又はぬるま湯で食後に服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15才以上）	3 錠	3 回
11才～14才	2 錠	
8才～10才	1 錠	
8才未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量 9錠中

成 分 名	分 量	作 用
マレイン酸 クロルフェニラミン	12mg	じんましんや鼻炎などのアレルギー 症状を改善します。
グリチルリチン酸二カリウム	153mg	炎症をおさえます。
リボフラビン	9mg	皮ふの代謝に関与するこれらのビタ ミンにより、代謝の不調を改善します。
塩酸ピリドキシン	36mg	
ニコチン酸アミド	90mg	
グルコン酸カルシウム	1650mg	じんましん、湿疹の症状をしずめます。

添加物：乳糖、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴール、酸化チタン、カルナウバロウ

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色くなることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 水分が錠剤に付着しますと、表面の一部が溶けて斑点を生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手でふれないで下さい。
- (5) 使用期限をすぎた製品は服用しないで下さい。



製品のお問い合わせ先

小林薬品工業株式会社 お客様相談室
電話 058(278)3933
受付時間 10時から16時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鷲1丁目139番地

本社所在地

東京都中央区日本橋箱崎町40番6号