

外用殺菌消毒薬

日本薬局方

第3類医薬品

希ヨードチンキ

Dilute Iodine Tincture

【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の部位には使用しないでください
粘膜（口唇等）、口の中、目の周囲、化膿している患部
- 本剤を使用している間は、次の医薬品を使用しないでください
マーキュロクロム液
- 広範囲又は長期連用しないでください

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 患部が広範囲の人。
(4) 深い傷やひどいやけどの人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感、水ぶくれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
アナフィラキシー様 症状	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能 効 果】 創傷面の殺菌・消毒

【用 法 用 量】 適量を1日数回患部に塗布してください。

〈用法用量に関連する注意〉

- 用法用量を厳守してください。
- 患部及び皮膚に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないでください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

【成 分 分 量】 100mL中 ヨウ素3g含有
添加物：ヨウ化カリウム、エタノール

- 【保管及び取扱い上の注意】**
- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
 - (4) 火気に近づけないでください。
 - (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 〈貯法〉**
気密容器。火気を避けて室温保存。
- 【包装】** 50mL、100mL

殺菌・消毒に

100mL Dilute Iodine Tincture

希ヨドチン

日本薬局方
外用殺菌消毒薬

第3類医薬品

d
P

第3類医薬品

外用殺菌消毒薬

日本薬局方

希ヨドチン

Dilute Iodine
Tincture

100mL

殺菌・消毒に

健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

紙箱

製造番号
使用期限

1



函箱用紙

各製薬箱

P

第3類医薬品

外用殺菌消毒薬

日本薬局方

希ヨドチン

Dilute Iodine
Tincture

100mL

殺菌・消毒に

健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

日本薬局方 希ヨドチンキ

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
粘膜(口唇等)、口の中、目の周囲、化膿している患部
3. 本剤を使用している間は、次の医薬品を使用しないでください
マキキュロクロム液
4. 広範囲又は長期連用しないでください

■ 相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 患部が広範囲の人。
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感、水ぶくれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

2401

01

CX-8

1201