

第3類医薬品

傷口をソフトに包んで化膿を防ぐ

〈殺菌消毒薬〉

タマガワ
新リバガーゼ[®]A

SHIN-RIBAGAUZE A

第3類医薬品

〈殺菌消毒薬〉

化膿を防ぐ

新

タマガワ
リバガーゼ[®]A

アクリノール0.4%液含浸ガーゼ

油紙
ピンセット
入り

50 枚入

外用/ガーゼサイズ:8cm×5cm

販売名:タマガワ新リバガーゼA

効能・効果

切傷・擦過傷(すり傷)・化膿性創傷

成分・分量 1.2g中

アクリノール水和物0.4%液……1.0g

ガーゼ……………0.2g

添加物 グリセリン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(調用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 衣類に付着すると黄色に着色し、脱色していくので、注意すること。
- (5) 使用期限のすぎた製品は使用しないこと。(箱側面に記載)

第3類医薬品



玉川衛材(株) お客様相談窓口
TEL. 03-3861-2037
受付時間 9:00-17:00(土・日・夜を除く)

製造販売元

玉川衛材株式会社

東京都千代田区岩本町2-2-16

http://www.tamagawa-eizai.co.jp

<BE>

第3類医薬品

〈殺菌消毒薬〉

化膿を防ぐ

新

タマガワ
リバガーゼ[®]A

アクリノール0.4%液含浸ガーゼ

使用期限

製造番号

△ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー一症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
3. 5～6日使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

● 用法・用量

ピンセットでガーゼを取り、患部に貼付して油紙を当て、軽くホータイをして下さい。1日1回交換

用法及び用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用すること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 患部を清潔にし、ガーゼ部分を汚さないように注意して使用すること。

販売元: 玉川衛材(株) 玉川衛材株式会社

