

第3類医薬品

殺菌消毒薬

日本薬局方

エタノール

Ethanol

500mL

火気厳禁 第四類アルコール類・水溶性・危険等級II

*2011年10月改訂(第2版)
2009年4月作成

使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。
2. 次の部位には使用しないでください。
1) 損傷皮膚 2) 粘膜(口唇等) 3) 目のまわり



相談すること

- *1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人
- *2. 使用後、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- *3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

本品830mLを精製水でうすめて1000mLとし、これを脱脂綿、ガーゼ等に浸して軽く塗布する。

〈希釈方法〉

下表に従い、本品を精製水で薄め全量とした液(エタノールとして79.2vol%)を使用してください。

本品(mL)	全量(mL)
50	60
100	120
250	300
500	600

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 定められた用法・用量を守ってください。
2. 外用にのみ使用し、内服しないでください。
3. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
4. 同一部位にくり返し使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがありますので注意してください。
5. 長期間または広範囲に使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
6. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

【成分】

本品100mL中、日局 エタノール 100mL

* (本品は15℃でエタノール95.1~96.9vol%を含みます。)

【保管及び取扱い上の注意】

1. 火気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 揮発性がありますので、使用後は密栓して保管してください。
4. 誤用の原因になったり品質が変わるおそれがありますので、他の容器に入れ替えないでください。
5. 本品はニスや溶かすので、ニスの塗ってある建具や家具等には本品が付着しないように注意してください。

【お問い合わせ先】

中北薬品株式会社 製薬工場事業部

電話 0567-32-1431

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



キャップ：PP
容 器：PE

使用期限

製造番号

開封日

年 月 日



215521K

発売元

 中北薬品株式会社

愛知県津島市白浜町字番場52-1

製造販売元

 ヤクハン製薬株式会社

北海道北広島市北の里27番地