

第3類医薬品

飲用不可

殺菌消毒薬

消毒用エタノール・ イソプロ液

500mL



環境を配慮した、
たためるボトル採用

殺菌・消毒に

塗擦又は*ガーゼ、脱脂綿等に
浸して清拭する。



発売元 大洋製薬株式会社 製造販売元 ヤクハン製薬株式会社
東京都文京区本郷3丁目14-16 北海道北広島市北の里27番地

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

4. 誤用の原因になったり品質が変わるおそれ
がありますので、他の容器に入れ替えないで
ください。*

5. 本品はニス溶于すので、ニスの塗ってあ
る建具や家具等には本品が付着しないよう
に注意してください。

火気厳禁 アルコール類 危険等級II 水溶性

使用期限(上段)、製品番号(下段)は容器底部に記載

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 *
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル)

JAN



キャップ: PP
容器: PE
ラベル: PE

ラベルと容器は同じ材質ですが、
分別は各自治体が定める方法に
従ってください。

312604K

* 2014年11月改訂

使用に際しては、この説明文書を必ず
お読みください。*

使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作
用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください。

- 1) 損傷皮膚*
- 2) 粘膜(口唇等)
- 3) 眼*のまわり



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録
販売者*に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こし
たことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は*
副作用の可能性があるため、直ちに使用
を中止し、この容器を持って医師、薬剤
師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚*	発疹・発赤、かゆみ

(右面に続く)*

【効能・効果】

手指・皮膚*の殺菌・消毒

【用法・用量】

塗擦又は*ガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭する。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 定められた用法・用量を守ってください。
2. 外用にのみ使用し、内服しないでください。
3. 眼*に入らないように注意してください。万一、
眼*に入った場合には、すぐに水又は*ぬる
ま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合
には、眼科医の診療を受けてください。
4. 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけに
とどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付し
ないでください。*
5. 同一部位にくり返し使用した場合には、脱
脂等による皮膚*荒れを起こすことがあり
ますので注意してください。
6. 長時間又は*広範囲に使用する場合には、
蒸気の吸入に注意してください。
7. 小児に使用させる場合には、保護者の指導
監督のもとに使用させてください。

【成分・分量】

エタノール 76.9～81.4vol%

添 加 物：イソプロパノール

【保管及び取扱い上の注意】

1. 火気を避け、直射日光の当たらない涼しい
所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 揮発性がありますので、使用後は密栓して
保管してください。

(右面に続く)