

第2類医薬品

# 速乾性手指消毒剤 ヒビスコールフォーム

0.2%CHGエタノール製剤

500mL **FOAM**

SARAYA



火気厳禁

危険物第4類  
アルコール類(エタノール)  
引火性 水溶性・危険等級II

のめません

使用開始	月	日
とりかえの目安	月	日

mL  
(残量目安)

400

300

200

100

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。

第2類医薬品

mL  
(使用量目安)

100

200

300

400

【販売名】ヒビスコールフォーム

クロルヘキシジングルコン酸塩を有効成分とする速乾性の手指消毒剤で、エタノール蒸発後も効果が持続します。手に取ったとき、手の平からこぼれにくいだけでなく、使用感のよい泡状の手指消毒剤です。本剤による手あれを軽減する成分として湿潤剤(添加剤)を配合しています。

△使用上の注意

☒ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

☒ **次の部位には使用しないこと** (1) 損傷のある皮膚。(2) 目の周囲、粘膜等。

☒ **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能又は効果】手指の消毒 【用法及び用量】適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む  
＜用法及び用量に関連する注意＞(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(3) 外用にのみ使用すること。(4) 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用すること。

【成分及び分量】ヒビスコールフォームは、100mL中に有効成分として、クロルヘキシジングルコン酸塩0.2g、溶剤としてエタノール、その他添加物としてポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、アジピン酸ジイソブチル、アラントインおよびポリオキシエチレンヤシ脂肪酸グリセリルを含有する。【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓し保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。) (4) 取扱う場合、換気を十分行うこと。(5) 火気に近づけないこと。(6) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。(7) 本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗装面や衣服などについたりすると変色する場合がありますので注意すること。

【お問い合わせ先】本剤についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

サラヤ株式会社 学術部

電話番号：06-4706-3938

受付時間：平日 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931

製造番号：底面記載

使用期限：底面記載

サラヤ株式会社

大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525

ボトル:PE  
ポンプ:PP  
フィルム:PP

MADE IN JAPAN

