

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

06

皮膚疾患治療薬

第2類医薬品

## 化膿を伴うしっしん、皮膚炎に クロマイ<sup>®</sup>-P軟膏

### クロマイ-P軟膏の特徴

- クロラムフェニコール、フラジオマイシン硫酸塩の2つの抗生物質を配合し、化膿した患部を治します。
- プレドニゾロン（ステロイド成分）が、しっしん、皮膚炎等の炎症に優れた効き目を発揮します。
- 患部を保護する油性基剤なので、じゅくじゅくした患部に適しています。

### ！ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないで下さい  
本剤又は抗生物質によるアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないで下さい  
(1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等  
(2) 目や目の周囲
3. 長期連用しないで下さい

#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人  
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(5) 患部が広範囲の人  
(6) 湿潤やただれのひどい人  
(7) 深い傷やひどいやけどの人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、水疱
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

### ■ 効能・効果

- 化膿を伴う次の諸症：湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、しもやけ、虫さされ、じんましん
- 化膿性皮膚疾患（とびひ、めんちょう、毛のう炎）

### ■ 使用法

1日1～数回、適量を患部に塗布して下さい

〈使用法に関連する注意〉

1. 使用法を厳守して下さい。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
3. 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
4. 外用にのみ使用して下さい。
5. 化粧下、ひげそり後などに使用しないで下さい。

### ■ 成分・分量

本品は乳白色ゼリー状の軟膏剤で、1g中に次の成分を含有しています

成分	含量 (1g中)
クロラムフェニコール	20mg(力価)
フラジオマイシン硫酸塩	5mg(力価)
プレドニゾロン	3mg

添加物：ゲル化炭化水素

### ■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電話 03 (6667) 3232

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

06®登録商標



製造販売元

**第一三共株式会社**

東京都中央区日本橋本町3-5-1



販売元

**第一三共ヘルスケア株式会社**

東京都中央区日本橋小網町1-8