



化膿止め軟膏

マーレンS

第2類医薬品

(化膿性皮膚疾患用薬)

◆マーレンSは、サルファ剤(スルファジアジン)と殺菌剤(クロルヘキシジン塩酸塩)が持つ殺菌作用により化膿をおさえ、さらに患部の治りを助ける4つの成分を配合した化膿止め軟膏です。



使用上の注意



相談すること



- ① 次の人は使用前に医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 患部が広範囲の人。
- (4) 湿潤やただれのひどい人。
- (5) 深い傷やひどいやけどの人。

- ② 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- ③ 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**


効 能

化膿性皮膚疾患(とびひ、めんちょう、毛のう炎)

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布又は貼用してください。

〈チューブの穴の開け方〉



キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。

〔注意〕

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

成分

100g中

成分	分量	はたらき
スルファジアジン	5g	殺菌作用により、患部の化膿を防ぎます。
クロルヘキシジン塩酸塩	0.5g	
アラントイン	0.5g	肉芽形成を促進し、患部の治りを促します。
レチノールパルミチン酸エステル	200000 I.U.	皮膚に栄養を与え、患部の治りを助けます。
トコフェロール酢酸エステル	0.1g	血行を良くし、患部の治りを促します。
酸化亜鉛	5g	患部を保護し、治りを助けます。

添加物：BHT、ジメチルポリシロキサン、パルミチン酸デキストリン、流動パラフィン、ワセリン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)



とびひ、めんちょうとは？

〈とびひ〉

細菌が皮膚に感染して化膿をおこす病気で、肌が赤くなり、周囲に水ぶくれができます。感染しやすいことからとびひ(飛び火)といわれています。

〈めんちょう・毛のう炎〉

ブドウ球菌によっておきる毛穴の炎症で、黄色いうみを持ち、周囲がやや赤くはれます。顔にできるものを特にめんちょうといいます。

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)