

20代からの大人ニキビにも効く

ACNEGIA®

アクネージア




【メディカルミスト】

いつも同じような場所に繰り返しできる、生理前になるとできる、乾燥肌なのにどうして…。

乾燥によるバリア機能の衰えや新陳代謝の低下により、毛穴周りの角質層が厚くなると、毛穴がつまつて皮脂が溜まり、ニキビができます。また、生理前・ストレスなどによるホルモンバランスの乱れは、皮脂分泌を増加させ、ニキビの原因になります。


「アクネージア® ニキビ薬」は、肌の乾燥を防ぎながら、毛穴つまりの原因・古くなった角質を取り除くニキビ治療薬です。




使いやすい
「ミストタイプ」

逆さまにしても
使えるので、
背中にも使いやすい。


【ニキビのできるメカニズム】



古い角質が溜まる



毛穴をふさぎ
皮脂が溜まる



皮脂が酸化し
炎症が起きる



アクネ菌が繁殖し化膿すると
あとが残りやすくなります

「アクネージア」ニキビをしっかり治す3つの効果

1 古い角質を落とし、毛穴つまりをとる!

角質軟化作用で古い角質を取り除き、つまつた毛穴を開きます。

うるおい成分
配合

2 ニキビの原因菌を抑える!

ニキビの原因菌を殺菌して、増殖を防ぎます。

オイルフリー

3 赤み・はれ・炎症を鎮める!

できてしまったニキビの炎症を鎮めます。
傷ついた組織を修復する効果もあります。

無香料
・
無着色

【アクネージア® シリーズ】



ポイント使いにクリームタイプ
メンソレータム® アクネージア®
メディカルクリーム

第2類医薬品 16g



フェイスラインにも使いやすい
ローションタイプ
メンソレータム® アクネージア®
メディカルローション

第2類医薬品 100mL



背中にも使いやすい
ミストタイプ
アクネージア® ニキビ薬

第2類医薬品 100mL

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名：アクネージア ニキビ薬

100mL

第2類医薬品

ニキビ治療薬

使用上の注意 してはいけないこと 

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください。目や目の周囲

相談すること 

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 湿潤やただれのひどい人
 - (5) 深い傷やひどいやけどの人
 - (6) 硬結(硬いしこり)のある重症の人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

4. その他

- (1) 本剤は傷口があると、しみる、ヒリヒリする等の一過性の刺激があらわれることがあります。刺激が気になる場合は、使用を中止してください。
- (2) 本剤の使用により、皮ふが多少乾燥したり、赤みがさしたりすることがあります。そのときは使用を一時中止してください。再び使用するときは間隔をあけて使用してください。

【効能・効果】

ニキビ

【用法・用量】

1日2回(朝・晩)適量を患部に塗布する。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 使用前に腕の内側などに少量を塗布して一晩そのままにしておき、翌朝、塗布部位に過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)があらわれた場合は使用をお避けください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

【成分】

有効成分	分量
エタノール	22.84%
サリチル酸	0.5%
アラントイン	0.2%

添加物：1,3-ブチレングリコール、キサンタンガム、パラベン

【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(容器底に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (5) 冷所に保管すると結晶が析出することがありますので、0℃以下の保管はお避けください。
- (6) エタノールを含むため、火の近くでの使用および保管はお避けください。
- (7) 衣服、寝具、家具、床等につかないように十分ご注意ください。
(材質によっては落ちにくいことや変色がある)

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 / 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

401127302