



第2類医薬品

ご使用に際しては、この説明
文書を必ず読んでください。
また、必要なときに読めるよ
う大切に保存してください。

外傷治療剤

シカポン®

〈シカポン〉は各種化膿菌に対し殺菌作用のある
アクリノール水和物や、広範囲の細菌に抗菌力
のあるスルファジアジンを主成分とし、更に肉芽の
発生や表皮の形成を促進させるビタミンD₃を配合
しています。また基剤として、患部の分泌物をよく
吸着するポリエチレングリコール軟膏を使用し
ていますので、二次感染を防ぎ患部の治癒をより
早める効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売
者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたこ
とがある人。
 - 患部が広範囲の人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
 - 深い傷やひどいやけどの人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用
の可能性があるので、直ちに使用を中止し、
この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売
者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合
は使用を中止し、この文書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分・分量】 (100g中)

スルファジアジン	5.0g
アクリノール水和物	0.1g
ビタミンD ₂	0.35mg

その他、添加物として
ポリエチレングリコール、香料を含有する。

【効能】

やけど、きりきず、すりきず、おでき、とびひ

【用法・用量】

1日1～2回適量を患部に塗布するかガーゼ等にのばして貼付してください。

〔用法・用量に関する注意〕

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 分泌物の多いときは本品の適量を塗りつけ、その上にガーゼを重ねて吸い取らせ、1日2～3回ガーゼを取換えてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局、薬店又は下記会社「相談窓口」までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

製造販売元：**松田薬品工業株式会社**

愛媛県松山市河野中須賀318

電話 (089)994-1333

〔受付時間 8:30～17:00
(土、日、祝日を除く)〕