

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

赤いにきび、にきびのはれ、にきびの治療に

# DHC にきび軟膏

<にきび治療薬>

第3類医薬品

DHCにきび軟膏には、イオウやグリチルレチン酸といった、できてしまったにきびを治療する成分と、新しくにきびができないようにする成分が配合されています。



## 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 患部が広範囲の人。
  - 湿潤やただれのひどい人。
  - 深い傷やひどいやけどの人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
  - 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2)5~6日間使用しても症状がよくなる場合。

## ■ 効能・効果

にきび

## ■ 用法・用量

1日2～3回、適量を塗布又は塗擦してください。

### 【用法・用量に関連する注意】

- 1.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 2.目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 3.外用にのみ使用してください。
- 4.使用前に少量をひじの内側に塗り、翌日発疹・発赤、かゆみなどが認められた場合には使用しないでください。

## ■ 成分・分量

100g中

イオウ	5.0g
グリチルレチン酸	0.3g

添加物として、ベントナイト、グリセリン、エタノール、イソプロピルメチルフェノール、メチルパラベン、プロピルパラベンを含有します。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.使用後は、チューブの口、キャップをきれいにぬぐって、しっかりキャップをしてください。

医薬品  
相談室

tel. 03-3762-2581

受付時間 9:00～17:00(日・祝日をのぞく)

DHC

製造販売元

株式会社ディー・エイチ・シー

東京都港区南麻布2-7-1 ☎0120-333-906

DHCホームページ

パソコン <http://www.dhc.co.jp>  
携帯 <http://www.dhc.jp>