

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

鎮痒・消炎薬

しっしん・かゆみ・皮ふ炎に

第2類医薬品

プロタッチ PROTOUCH

皮ふ疾患の多くは炎症やげいしいかゆみを伴います。とくにかゆみをかまんすることは困難なことです。かゆいところをかくと、炎症を悪化させたり、さらにはばい菌が入って化膿したりします。

プロタッチは炎症をしずめる成分や、かゆみを抑える成分に殺菌作用のある成分を配合した鎮痒消炎作用のある外用剤です。

プロタッチの有効成分は溶解状態で配合され、均一に分散されており、すみやかに皮ふに浸透します。

また、サラリとした延びのよいクリーム剤で、かゆみを伴うカサカサした患部に優れた効きめがあり、使用感も良好です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

1. 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部に使用しないこと
2. 長期連用しないこと



相談すること


1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ等の症状
皮 膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

効能・効果

湿疹、かゆみ、かぶれ、皮ふ炎、ただれ、あせも、しもやけ、虫さされ、じんましん



用法・用量

1日数回患部に適量を塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1)定められた用法をお守りください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用してください。

成分と作用 (100g中)

成分	含量	作用
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	湿疹・かぶれなどの炎症をしずめ、アレルギーを抑えます。
クロタミトン	5.0g	かゆみを抑えます。
グリチルレチン酸	0.5g	湿疹・かぶれなどの炎症をしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	ばい菌に対し、殺菌作用をしめします。

添加物としてスクワラン、1,3-ブチレングリコール、セタノール、ステアリン酸ポリオキシル、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、その他1成分を含有する。

(保管及び取扱い上の注意)

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)外箱に表示してある使用期限内にご使用ください。

お問い合わせ先

ミヤリサン製薬株式会社 お客様相談室

住所：東京都北区上中里1-10-3

電話：(03)3917-1191

受付時間：9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)