

消炎・鎮痛冷感ハップ剤

エスエスびったりハップ[®]

第3類医薬品

エスエスびったりハップは…

- 冷温布効果と消炎・鎮痛効果をあわせもったハップ剤で、うちみ・ねんざにともなう熱感、はれ、痛みをやわらげます。
- 粘着性にすぐれ、しかもタテ、ヨコ、ナナメの全方向伸縮自在の布を使用していますから、ひじやひざなどのはがれやすい関節部にもピッタリフィットします。
- クールな貼り心地で、肌ざわりもよく、使用後もやさしくはがせます。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1.次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 本人又は家族がアレルギー体质の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】

打撲、ねんざ、筋肉痛、筋肉疲労、骨折痛、腰痛、肩こり、関節痛、しもやけ

【用法・用量】

表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1~2回貼付します。
※患部の広さに応じて、フィルムの上から適当な大きさにハサミで切ってご使用ください。

エスエスびったりハップは関節部にもピッタリフィット！



〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとつてから使用してください。
- (4) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成 分】膏体100g(1000cm²) 中

サリチル酸グリコール……………1.5g
ハッカ油……………1.5g
D寥一カンフル……………0.5g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE酢酸エステル)……0.3g
添加物として、CMC-Na、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、ゼラチン、ロ-ソルビトール、流動パラフィン、ヒマシ油、ポリアクリル酸Na、ポリビニルアルコール、カオリン、酸化チタン、グリセリン、ラウリン酸マクロゴール、酒石酸、エデト酸Naを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 品質保持のため、開封後は袋のチャックをしっかりとしめ、外気にふれないようにして保管してください。
- (5) 使用期限をすぎたものは使用しないでください。

【お問い合わせ先】

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

■0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

エスエス製薬株式会社
〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4
<http://www.ssp.co.jp/>

副作用被害救済制度の
お問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
■0120-149-931