

イブアウター-I テープ

肩こり痛 | 腰痛

粘着性・伸縮性に優れ、肩などの関節部におすすめです。

この箱(説明)は、本剤とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤による過敏症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。[以前薬を使用してアレルギー症状を起こしたことがある人は、再び同じ薬を使用するとさらに強い症状を起こす可能性があります。]
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。[ぜんそくのある人がインドメタシン等の抗炎症剤を使用するとぜんそく発作を誘発することがあります。]

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし、たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください

🗣 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-------------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感 |

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合。

貼り方 (貼りやすい3分割フィルム)



効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 11才未満の小児には使用させないでください。
- (3) 11才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (5) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。
- (6) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (7) 皮膚の特に弱い人は、同じ箇所には続けて貼らないでください。

成分 膏体100g(10,000cm²)中

インドメタシン.....3.75g(3.75%)
 添加物として、エステルガム、脂環族飽和炭化水素樹脂、流動パラフィン、マクロゴール、ミリスチン酸イソプロピル、プロピレングリコール、*l*-メントール、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 品質保持のため、開封後は袋の口を折り返し、外気にふれないようにして保管してください。
- (5) 使用期限をすぎたものは使用しないでください。

製造販売元



Eisai 製薬株式会社
 東京都中央区日本橋浜町2-12-4
<http://www.ssp.co.jp/>

第2類
 医薬品

[お問い合わせ先] お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

Eisai 製薬株式会社 お客様相談室

☎ 0120-028-193 受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

■副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/> ☎ 0120-149-931