

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

ここを押して  
開けてください。

## 第2類医薬品

# オールパスFR

### 【特徴】

- オールパスFRは痛みの原因物質の生成を抑えることにより、肩の痛み、腰痛、関節痛などに効果をあらわすフェルピナクを配合しています。
- オールパスFRは柔軟性のある基布を使用していますので貼りやすく、粘着性にすぐれ関節部にもよくフィットします。

### ⚠️（使用上の注意）

#### ❌ してはいけないこと

＜守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります＞

#### 1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど）を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。

#### 2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) 水虫・たむし等又は化膿している患部。

#### 3. 長期連用しないでください



#### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど）を起こしたことがある人。

#### 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれなど

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社 大石膏盛堂

電 話 (0942) 83-2112

受付時間 午前9:00～11:45 午後1:00～4:30

(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

### 【効能・効果】

関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

### 【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

#### ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い個所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4) 連続して2週間以上使用しないでください。
- (5) 患部の皮ふは清潔にし、汗をよく拭き取ってからお貼りください。

### 【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

フェルピナク・・・0.5g

添加物として・メントール、流動パラフィン、脂環族飽和炭

水素樹脂、その他3成分を含有します。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、封開口をきちんとしめ、外気にふれないようにして保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 **株式会社大石膏盛堂**

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

企画協力 **株式会社 近江兄弟社**



4 987475 114066

