

HapYcom

ハピコム

第3類医薬品

肩こり
腰痛
関節痛

新ホームパスW

ムレにくく肌にやさしい!!

血行促進作用・穴あき

内容量 80枚

保存袋付

微温感

原寸大

7.0cm

5.5cm

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

外用消炎・鎮痛貼付剤 Analgesic Patch

新ホームパスW

80枚入(20枚×4)サイズ7.0cm×5.5cm

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果：腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

製造番号

使用期限

第3類医薬品

用法・用量

1日1～2回薬面の上のライナーをはがして患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)患部の皮膚は清潔にし、汗などをよく拭き取ってからお貼りください。
- (3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4)貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分～1時間前にはがしておはいいりください。また、入浴直後の貼付はさけてください。
- (5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6)皮膚の特に弱い人は、同じところには続けて貼らないでください。

成分・分量 膏体100g中に次の成分を含んでいます。

トメントール	5.71g
サリチル酸メチル	6.29g
dl-カンフル	1.5g
トコフェロール酢酸エステル	2.0g
ノナン酸バニリルアミド	5mg

添加物としてBHT、酸化亜鉛、ポリブテン、ポリイソブチレン、赤色225号、橙色403号、生ゴム、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、保存袋に入れて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社 大石膏盛堂 電話(0942)83-2112

受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社大石膏盛堂**
佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

副作用被害救済制度
☎ 0120(149)931