

第2類医薬品

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限（パッケージ底面および容器底面に記載）を
過ぎた製品は使用しないこと

販売名：アンメルシン1%ヨココヨ

External Anti-Inflammatory/
Analgesic Containing Indometacin

外用消炎鎮痛剤

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなる）

1. 次の人は使用しないこと

(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を
起こしたことがある人

(2) ぜんそくを起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜など (2) 湿疹、かぶれ、傷口

(3) みずむし・たむしなど、または化膿している患部

3. 長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師
または登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦または妊娠していると思われる人

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性が
あるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って
医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、 ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は
使用を中止し、このパッケージを持って医師、
薬剤師または登録販売者に相談すること

製品のお問合せは、お買い求めのお店
またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先（お客様相談室）

0120-5884-01

9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

税 控除 対象

成分・分量 100mL中

インドメタシン 1000mg
l-メントール 3000mg
添加物として、グリチルレチン酸、ベンジルアル
コール、ラウロマクロゴール、炭酸プロピレン、
pH調整剤、BHT、ハアセチルしょ糖、エタノ
ールを含有する

効能・効果

関節痛、腰痛、打撲、捻挫、筋肉痛、腱鞘炎（手・手
首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、肩こりに
伴う肩の痛み

用法・用量

1日4回を限度として患部に適量塗布してください

＜用法・用量に関連する注意＞

- 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護
者の指導監督のもとに使用させること
- 11歳未満の小児に使用させないこと
- 目に入らないように注意すること
万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま
湯で洗うこと
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受
けること
- 外用にのみ使用すること
- 1週間あたり50mLを超えて使用しないこと
●塗布部位をラップフィルムなどの通気性の悪いも
ので覆わないこと
●皮ふの特に弱い人は、同じところに続けて使用
しないこと
●同じ部位に他の外用剤を併用しないこと

保管および取扱い上の注意


- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいと
ころ（冷暗所）にキャップをしっかりとめて立
てて保管すること
- 小児の手の届かないところに保管すること
- 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因に
なったり品質が変わる）
- 火気に近づけないこと（エタノール含有物）
●キャップをしっかりとめないと液がもれるこ
とがある
●プラスチック製品（眼鏡わく、くし、便座など）、
化繊の衣類、木材（塗料塗家具、床など）、皮革
などに液がつくと損耗したり、シミになること
があるので注意すること
●衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に
従って、すみやかに洗うこと

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物 水溶性



ラベル
ボトル
キャップ



特徴

- 腰、肩、ひざの痛みに優れた効
き目を発揮する塗り薬です
- ラバー面積が4倍(当社比)
手を汚さず、効き目成分を
一度でたっぷり塗れます
- 有効成分インドメタシンが
皮ふからすばやく浸透し、
関節の痛みを和らげます