



肩こり、筋肉痛

アンメルツ ヨコヨコ

■ 保管及び取扱い上の注意 ■

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所（冷暗所）にキャップをしっかりとしめて立てて保管すること
- 小児の手の届かない所に保管すること
- 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
- キャップをしっかりとしめないで液が漏れることがある
- プラスチック製品（眼鏡わく、くし、便座等）、化繊の衣類、木材（塗料塗り家具、床等）、皮革等に液がつくと消耗したり、シミになることがあるので注意すること

火気厳禁 第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

第3類医薬品 **82mL**

税 控除 対象

POS標準
倍率見本0.80倍
4987072001264

4 987072 001264

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
使用期限を過ぎた製品は使用しなさいこと

販売名：アンメルツヨコヨコ
External Anti-Inflammatory / Analgesic

第3類医薬品 **外用鎮痛消炎剤**

特徴

1. **とても塗りやすいタイプです**
アンメルツヨコヨコは、容器の首の部分
が曲がっているので、塗りにくい背中や腰
の患部にも、薬液がにじみ出るラバー
キャップがピッタリと接し、スムーズ
に塗布することができます
2. **どこでもむらなく適量を
塗布できます**
ラバーキャップより適量の薬液がにじ
み出ますので、どの患部にも必要な
だけ、適量を塗布できます
3. **塗りごちのよい
さわやかな薬剤です**

▲ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなる）

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口

☒ 相談すること

① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販
売者に相談すること

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作
用の可能性があるので、直ちに使用を中止
し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販
売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、 痛み、熱感、ヒリヒリ感

③ 5～6日間使用しても症状がよくならな
い場合は使用を中止し、この箱を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

■ 成分・分量 100mL中 ■

サリチル酸メチル	5000mg
トメントール	5200mg
dl-カンフル	5200mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	100mg
チモール	700mg
ノナン酸パニリルアミド	10mg

添加物として、プロピレングリコー
ル、エタノール、フェニルエチルア
ルコールを含有する

■ 効能・効果 ■

肩のこり、筋肉痛、神経痛、腰痛、
打撲、筋肉のはれ、リウマチ、しもやけ

■ 用法・用量 ■

患部に適量を塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護
者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること。万
一、目に入った場合には、すぐに水又は
ぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い
場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること
- 塗布部位をラップフィルム等の通気
性の悪いもので覆わないこと
- 皮膚の特に弱い方は、同じ所に続け
て使用しないこと
- スポーツや入浴等、汗をかく前・後
に使用した場合、ヒリヒリとした刺激、痛み
や熱感が増すことがあります。これらの
症状が強い場合は、石鹸で洗い流す
と緩和します



製品のお問合せは、お買い求めのお店
又はお客様相談室にお願いいたします

▼ ありがたいな / をカタチにする

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN