

デントールップV

第3類医薬品

うちみ・ねんざ・筋肉痛・肩こり・腰痛

スポーツのあとに



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
 (独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



配置期限

ロット番号

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
 次の部位には使用しないこと
 (1) 目の周囲、粘膜等. (2) 湿疹、かぶれ、傷口.

👤 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人.
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5~6日間使用しても症状がよくなる場合場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分及び分量 膏体 100.0g中

dl-カンフル.....0.200 g
 l-メントール.....0.300 g
 サリチル酸グリコール.....1.000 g
 トコフェロール酢酸エステル.....0.300 g
 添加物として、D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、酸化チタン、カルボキシビニルポリマー、ポリソルベート80、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、モノオレイン酸ソルビタン、香料を含有します。

製造販売元 大協薬品工業株式会社
 富山市水橋畠等173

効能又は効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、関節痛、骨折痛、腰痛、筋肉疲労

用法及び用量

1日1~2回、膏面のライナーをはがし、患部に貼ってください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 用法及び用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないでください。
- 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- 多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるため、使用を控えてください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください (誤用の原因になったり品質が変わります.)。
- 開封後は袋の口を折り曲げて保管してください。
- 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社
 お客様相談窓口
 電話 076-479-1313
 受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

5枚入 (11.8cm×7.5cm)
 ¥750+税 PP T11