

痛みのもとに密着浸透!

ゴールドパスE

ビタミンE配合

肩こり

筋肉痛

腰痛

肌にやさしく
ムレにくい

穴あき
タイプ

サイズ(6.2cm×4.2cm)

第3類医薬品

消炎鎮痛プラスター

140枚入

保存袋付

痛みのもとに密着浸透!

肩こり / 筋肉痛 / 腰痛

ビタミンE配合

消炎鎮痛プラスター



この箱は環境に配慮し、水なし印刷方式、植物油インキを使用しております。

製造番号


使用期限



4 940794 442357

販売名：ゴールドパスE 鎮痛消炎薬

 使用上の注意

 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合、使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法及び用量

1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6) 皮膚の特に弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

肩こり / 筋肉痛 / 腰痛

消炎鎮痛プラスター

第3類医薬品

ゴールドパスE

ビタミンE配合

成分及び分量 (1.0m² 中(膏体 144.81g 当たり))

dl-カンフル	1.80g
サリチル酸メチル	9.00g
ハッカ油	1.20g
l-メントール	4.50g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.50g
ノニル酸ワニリルアミド	0.01g

添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 開封後は、添付の保存袋に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

発売元 新生薬品株式会社

製造販売元 大協薬品工業株式会社

富山市水橋島等173

お問合わせ先 大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口 電話：076-479-1313 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問合わせ先 電話：0120-149-931(フリーダイヤル)