



ローション

外用鎮痛・消炎剤

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、
関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫に



セルフメディケーション
税 控 除 対 象

ジクロフェナクナトリウム配合

外用 鎮痛・消炎剤

肩こりに伴う肩の痛み、
腰痛、関節痛、筋肉痛、
打撲、捻挫に

ローション

ℓ-メントール配合

シンパスジクロフェナク液

(1g中)ジクロフェナクナトリウム 10mg 配合

100mL

第2類医薬品

【効能・効果】

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、
関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首
の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、
打撲、捻挫

【用法・用量】

- 1日3～4回適量を患部に塗布して
ください。ただし、塗布部位をラッ
プフィルムなどの通気性の悪いもの
で覆わないでください。なお、本成
分を含む他の外用剤を併用しないで
ください。
- 15歳未満の小児は使用しないで
ください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)定められた用法・用量をお守り
ください。(2)本剤は、痛みやはれ
等の原因になっている病気を治療す
るのではなく、痛みやはれ等の症状
のみを治療する薬剤ですので、症状
がある場合だけ使用してください。
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服
しないでください。(4)1週間あた
り50mLを超えて使用しないでくだ
さい。(5)目に入らないように注意
してください。万一、目に入った場
合には、すぐに水またはぬるま湯で
洗ってください。なお、症状が重い
場合には、眼科医の診察を受けてく
ださい。(6)使用部位に他の外用剤
を併用しないでください。(7)通気
性の悪いもの(ラップフィルム、矯
正ベルト等)で使用部位を覆い、密
封状態にしないでください。(8)ス
ポンジ面を軽く患部に押し当て、薬
液をスポンジに浸透させてからご使
用ください。

開け口

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように保管してください。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなりやす)
1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
(3) 妊娠または妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。
 2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 皮ふの弱い部位(顔、頸、わきの下等)。(3) 湿疹、かぶれ、傷口。(4) みずむし・たむし等または化膿している患部。
 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を併用しないでください。
 4. 長期連用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の医薬品の投与を受けている人。ニューキノロン系抗菌薬。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮ふのあれ、落屑(フケ、アカのような皮ふのはがれ)、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィ ラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮ふ 炎、光線 過敏症	塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がることもあります。また、日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

【成分・分量】1g中

ジクロフェナクナトリウム…10mg
ℓ-メントール…30mg
添加物：エタノール、プロピレン
グリコール、ポリオキシエチレン
ポリオキシプロピレンセチルエー
テル、エデト酸Na水和物

【保管及び取扱上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)火気に近づけないでください。(4)メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、繊維の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。
- (5)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用してください。

製造販売元
株式会社 タカミツ
名古屋市中区上飯田東町4の69の1

本剤についてのお問い合わせは、
下記をお願いします
株式会社 タカミツ
☎ 0120-459533
受付時間
(月～金曜日 9:00～17:00祝日を除く)

副作用被害救済制度
☎ 0120(149)931



4 987487 103744



製造番号 使用期限

1801-AHI