

7枚入
(7cm×10cm)




貼るアクテージミニ

含水ジェルプラスター



お肌にやさしくフィット

有効成分インドメタシン配合



肩・首すじなどの貼りにくい部位にきれいに貼れる

肩こりの痛み・首すじなどの筋肉痛に

冷感
タイプ

第2類医薬品



貼るアクテージミニ 7枚入
(7cm×10cm)

DY1234
5678
9012

第2類医薬品
7枚入
(7cm×10cm)

第2類医薬品

微香性

7枚入
(7cm×10cm)

7枚入
(7cm×10cm)



外箱が開いていたり、中の包装が破れている等、開封された形跡がある場合は使用しないでください

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名：貼るアクテージミニ 第2類医薬品

特徴

- 鎮痛消炎成分インドメタシンを配合した含水ジェルタイプの外用鎮痛消炎プラスターです。
- インドメタシンがプロスタグランジンの産生を抑え、鎮痛・消炎作用を示します。
- 貼付部分に含水ジェルを使用しているため、はがれにくく、お肌にやさしくフィットします。
- 微香性で臭いが気になりません。●内袋には、チャックがついているため保管に便利です。

使用上の注意

※してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
 - (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないこと
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし・たむし等または化膿している患部。
3. 長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

製造販売元 武田薬品工業株式会社
大阪市中央区道修町四丁目1番1号

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
武田薬品工業株式会社
ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号
☎0120-567087
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先 電話0120-149-931

効能

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付すること。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用すること。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用すること。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。
- (5) 連続して2週間以上使用しないこと。

成分 膏体100g中

インドメタシン	1.0g
---------	------

添加物：l-メントール、パラベン、エデト酸ナトリウム水和物、プロピレングリコール、グリセリン、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、ヒドロキシプロピルセルロース、pH調整剤、その他3成分

保管および取扱い上の注意

- (1) 高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分は内袋に入れ、開口部のチャックをきちんとしめて保管すること。
- (5) 使用期限(外箱および内袋に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。また、一度開封した後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべくすみやかに使用すること。



4 987123 700054



D2