

湿疹・かぶれ・かゆみに

第②類医薬品

ワーボンプラス[®]軟膏

合成副腎皮質ホルモン配合外用薬

「湿疹」や「かぶれ」とはアレルギー反応などによって皮膚が炎症を起こした状態をいいます。患部が赤くはれ、ブツブツしたものができ、強いかゆみや痛みを伴うことが多いものです。ワーボンプラス軟膏はこのような「湿疹」「かぶれ」「かゆみ」に効果のある白色～微黄色の軟膏剤で、赤ちゃんからお年寄りまで幅広くご使用いただけます。



使用上の注意

 してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能

湿疹 かぶれ かゆみ あせも 皮膚炎 じんま疹 虫さされ しもやけ



用法・用量

1日1～4回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

成分(1g中)

成分	含量	はたらき
プレドニゾロン(合成副腎皮質ホルモン)	2.5mg	皮膚の炎症・はれを抑えます
グリチルレチン酸	5mg	皮膚の炎症・はれを抑えます
クロタミトン	50mg	不快なかゆみを抑えます
ジブカイン	2.5mg	不快なかゆみ・痛みを抑えます
クロルヘキシジン塩酸塩	2.5mg	患部を殺菌します

添加物:ステアリン酸ソルピタン、ステアリン酸、ミリスチン酸イソプロピル、スクワラン、パラフィン、ワセリン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



製造販売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区北浜2-6-18

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いいたします。
田辺三菱製薬「くすり相談センター」
(フリーダイヤル ☎ 0120-54-7080)
受付時間:弊社営業日の9:00～17:30

ホームページ www.mt-pharma.co.jp

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)