

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。必要な時に読めるよう大切に保管してください。

血行を良くし、コリ・痛みをやわらげる 第3類医薬品 **LION**  
**ハリックス<sup>®</sup> 55EX 温感**  
**微香性 鎮痛消炎パップ剤**

**特徴**

**1. ダブル消炎効果で、肩こり・腰痛などの症状に優れた効き目を発揮。**

サリチル酸グリコールに加え、抗炎症成分グリチルレチン酸を配合。患部の症状を鎮め、痛みをやわらげます。

**2. 温熱感が素早く立ち上がり、あたたかい貼り心地が持続します。**

有効成分トウガラシエキスが患部の血流を促進し、心地よい温熱感とともに、コリや痛みをやわらげます。

**3. 有効成分の浸透性に優れ、しかも肌にやさしい。**

弱酸性・高含水基剤(PAC-55)を採用しています。

**4. 身体の動きにピタッと密着する全方向伸縮自在ニット支持体を採用。**



関節部にもピタリと貼れます

**⚠ 使用上の注意**

**🚫 してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。



**相談すること**

**1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください**

- (1)本人又は家族がアレルギー体质の人。  
(2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

**2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください**

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合 (2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、痛み

**効能** 腰痛、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫(ねんざ)、骨折痛、しもやけ

**用法・用量** 表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1~2回貼付してください。

### 〈用法・用量に関する注意〉

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
2. 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
3. 本剤の使用により、とくに強いかゆみや痛みが出た場合には使用を中止してください。
4. 打撲、ねんざには、はれがひいてからご使用ください。
5. 貼ったまま入浴するとまれに刺激を感じることがありますから、少なくとも入浴の1時間前にはがしてください。また、入浴後は30分位してからお貼りください。
6. 汗をかいたり、患部がぬれているときはよく拭きとってからお貼りください。
7. 患部の広さに応じ、フィルムの上から適当な大きさに切ってご使用ください。

**成分** 膜体100g(1000cm<sup>2</sup>)中

有効成分	含量	はたらき
サリチル酸グリコール	2.0g	炎症、痛みをおさえます。
グリチルレチン酸	0.05g	炎症をおさえます。
トウガラシエキス (原生薬換算量1.0g)	0.02g	血流を改善します。
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	血流を改善します。

添加物として、香料、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸Na、CMC-Na、グリセリン、プロピレンジコール、ポリソルベート80、ヒドロタルサイト、エデト酸Naを含む。

### 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
4. 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口をきちんと二重に折りまげて外気にふれないようにしてください。

#### お問い合わせ先

ライオン株式会社 お客様相談室

☎(03)3621-6100

受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

〈ANALGESIC & ANTI-INFLAMMATORY CATAPLASM〉



0908