

かゆみ止めアートパッチ 第2類医薬品 40枚入

使用に際してこの説明書をよく読むこと。また、必要ときに読めるよう大切に保管すること。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感、色素沈着

- 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法・用量】パッチをライナーからはがし、1日数回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 外用にのみ使用してください。

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
 帝國製薬株式会社 お客様相談室
 電話(0879)25-2363 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元
帝國製薬株式会社
 香川県東かがわ市三本松567番地

発売元
日野薬品工業株式会社
 滋賀県蒲生郡日野町上野田119番地

(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用してください。

(5) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないでください。

【成分・分量】膏体100g(1m²)中

クロタミトン5.0g
 リドカイン2.0g
 ジフェンヒドラミン1.0g
 イソプロピルメチルフェノール1.0g

添加物として、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ハイシスポリイソプレンゴム、BHTを含みます。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと折り曲げて保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

[包装] 40枚入(20枚×2袋)(直径30mmの円形)



ここを押して
開けて下さい

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931



4 987403 753312