

販売名: **ヒドランパッチLM** **第3類医薬品**

鎮痒消炎剤 Anti-itching agent

[包装] 40枚入(20枚×2袋)
(直径3cmの円形)

【特徴】●ヒドランパッチLMは、かゆいところにペタンと貼るだけで、かゆみをおさえるパッチです。かき傷も防げます。

使用に際してこの説明文書をよく読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保管すること。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 虫さされ、かゆみ、しもやけ

用法・用量

パッチをライナーからはがし、1日数回患部に貼付する。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守すること。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3) 外用にのみ使用すること。(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。(5) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。

成分・分量 膏体100g中

ジフェンヒドラミン1.0g、イソプロピルメチルフェノール1.0g、
トコフェロール酢酸エステル0.5g、l-メントール3.0g

添加物として、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ハイスポリイソプレンゴム、BHT、流動パラフィン、その他2成分を含む。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
帝國製薬株式会社 お客様相談室
電話(0879) 25-2363
受付時間
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931



製 造 **帝國製薬株式会社**
販売元 香川県東かがわ市三本松567番地

ここを押して
開けて下さい