

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読み下さい。

かゆみ止め薬

第2類医薬品

カユドメリン[®] ゾル

製品の特徴

カユドメリン・ゾルは、虫さされ、かぶれ、じんま疹などのかゆみにすぐれた効き目をもつ透明・ゾル状の外用塗布剤です。水溶性の基剤を使用していますので皮膚にむらなく塗布でき、べとつかず、使用感もさわやかです。局所麻酔剤のペルカミンパーゼと抗ヒスタミン剤のクロルフェニラミンの働きで、患部のかゆみをすばやくしずめます。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 湿潤やただれのひどい人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

かゆみ

用法・用量

1日数回適量を患部に塗布して下さい。

〈用法・用量に関する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- 目に入らないよう注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- 外用にのみ使用して下さい。

成分とはたらき

成分	分量(1g中)	はたらき
クロルフェニラミン	5mg	抗ヒスタミン作用により、かゆみをし ずめます。
ベルカミンパーゼ	3mg	局所麻酔作用により、かゆみをしずめ ます。
l-メントール	40mg	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
dL-カンフル	20mg	

添加物として、イソプロパノール、プロピレングリコール、トリエタノールアミン、エタノール、ゲラニオール、メチルセルロース、カルボキシビニルポリマーを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 火気に近づけないで下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



ワンポイント情報

虫さされやじんま疹などによって患部にかゆみを生じた場合には、患部をかきむしらないで下さい。かきむしると皮膚を傷つけ、細菌感染などを起こしたり、症状が悪化したり、あとが残ることがあります。早めにかゆみ止め薬を塗り、かゆみや炎症をおさえて下さい。もし、薬が手元にない場合には、氷を当てたり冷水に浸すなどの応急処置をしておく、かゆみや腫れをやわらげることができます。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 東京支社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

(03)3293-3363 (ダイヤルイン)

(月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 但し祝日を除く)



販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

<http://www.wakunaga.co.jp/>

製造販売元

東興薬品工業株式会社

富山県中新川郡立山町辻20