



開け口

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

**△ 使用上の注意**

**⊗ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

**1. 次の人は使用しないこと**

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人
- (3) 11歳未満の小児

**2. 次の部位には使用しないこと**

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

**3. 長期連用しないこと**

**👨🏻‍⚕️ 相談すること**

**1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

**2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

**3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

**保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをしっかりと閉めて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり、品質が変わることがある)
- (4) 火気に近づけないこと
- (5) 火の中に投げないこと
- (6) 本剤のついた手で、目等の粘膜に触れないこと
- (7) メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面等に付着すると変質又は変色することがあるので、付着しないように注意すること
- (8) 本剤が衣類や寝具等に付着し、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落とすこと
- (9) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用すること

**火気厳禁**

第二石油類 危険等級Ⅲ 水溶性アルコール類含有物

**外用消炎鎮痛薬**

販売名：サンツールID液

**第2類医薬品** 内容量 100mL

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

お問い合わせ先  
株式会社 富士薬品(学術室)  
☎048-648-1118  
9:00～17:30(土、日、祝日を除く)



**患部に直接浸透**

**サンツール® ID液**

**筋肉痛  
関節痛・腰痛**

**インドメタシン 配合**

**1.0%**



セルフメディケーション  
**税 控除 対象**

**[液剤] 100mL**  
外用消炎鎮痛薬  
**第2類医薬品**

**効能・効果**

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

**用法・用量**

1日4回を限度として適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を守ること
- (2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (3) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (4) 外用にのみ使用すること
- (5) 1週間あたり50mLを超えて使用しないこと
- (6) 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと
- (7) 皮膚の特に弱い方は、同じ所に続けて塗布しないこと
- (8) 同じ部位に他の外用剤との併用は避けること
- (9) 使用後は手を洗うこと

**成分・分量 <100mL中>**

インドメタシン	1.0g
l-メントール	3.0g

添加物：エドト酸ナトリウム水和物、ヒプロメロース、マクロゴール、ベンジルアルコール、エタノール 含有



4 987524 105113

製造販売元：東和製薬株式会社  
和歌山県紀の川市貴志川町丸橋1229番地

発売元：株式会社 富士薬品  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地