

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

▲ 使用上の注意

※ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないこと
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) ぜんそくを起こしたことがある人
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(4) 15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等
(2) 皮膚の弱い部位(顔、頭、わきの下等)
(3) 湿疹、かぶれ、傷口
(4) みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないこと
4. 長期連用しないこと

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 次の医薬品の投与を受けている人
 ニューキノロン系抗菌剤
2. 使用中又は使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮膚のあれ、落屑(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみを伴う発疹・発赤、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎、 光線過敏症	塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・たれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がる場合があります。また、日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日3～4回適量を患部に塗布して下さい。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないこと

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を守ること
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用すること
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと
- (4) 1週間あたり50gを超えて使用しないこと
- (5) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (6) 使用部位に他の外用剤を併用しないこと
- (7) 通気性の悪いもの(ラップフィルム、矯正ベルト等)で使用部位を覆い、密封状態にしないこと

【成分・分量】(100g中)

成分	分量
ジクロフェナクナトリウム	1.0g
l-メントール	3.0g

添加物：ジブチルヒドロキシトルエン、アジピン酸ジイソプロピル、ベンジルアルコール、マクゴロール、クエン酸水和物、エタノール

セルフメディケーション

税 控除 対象



外用鎮痛消炎剤
販売名：サンツールDF液α

第2類医薬品

内容量 100mL
03
紙 : 箱
プラ : ボトル
キャップ



サンツールDF

液α

肩の痛み・腰痛
筋肉痛・関節痛

清涼感 l-メントール

鎮痛力

ジクロフェナク
ナトリウム配合



第2類医薬品

100mL

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをしっかりと閉めて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり、品質が変わることがある)
- (4) 火気に近づけないこと
- (5) 火の中に投じないこと
- (6) 本剤のついた手で、目等の粘膜に触れないこと
- (7) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、繊維の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面等に付着すると変質又は変色することがあるので、付着しないように注意すること
- (8) 本剤が衣類や寝具等に付着し、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落とすこと
- (9) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用すること

— お客様ご相談窓口 —

お買い求めのお店又は下記窓口まで
東和製薬株式会社(お客様相談窓口)
電話 0120-108-871
受付時間 9:00～17:30
(土・日・祝日を除く)

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ 水溶性エタノール含有物 100mL

副作用被害救済制度
電話：0120-149-931

製造販売元

東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市貴志川町丸呑1229番地