

トクホンエースホット<温感>

第3類医薬品

Tokuhon Ace hot

外用消炎鎮痛プラスター/貼り薬

特長

SIS基剤の採用により、サリチル酸グリコールが、速やかに患部に浸透し、つらい痛みにすぐれた効果を発揮します。
ノニル酸ワニルアミドの温かな刺激とビタミンEの作用で血行が改善され、頑固なコリをほぐします。
ソフトな基剤と伸縮性の基布の採用で、関節部でもピッタリと密着します。
微香性で目立たないファンデーションカラーです。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと
 - 1) 目の周囲、粘膜等
 - 2) 湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 2) 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人
2. 次の場合は直ちに使用を中止し、説明書をもって医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 使用後、次の症状があらわれた場合


関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み

- 2) 5～6日間使用しても症状の改善が認められない場合


【効能又は効果】腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法及び用量】薬剤面をおおったフィルムをはがし、1日数回患部に貼付して下さい。

貼り方



フィルムを二つに折り、小さい方のフィルムをはがします。



はがした薬面を患部に貼り、もう片方のフィルムを引っぱりながら貼ります。

1. 小児に使用させる場合には、保護者の監督指導のもとに使用させ、13歳未満の人には使用しないで下さい。
2. 患部を清潔にしてから使用して下さい。
3. 皮膚の弱い人は、同じ所に続けて使用しないで下さい。
4. 使用前に腕の内側の皮膚の弱い所に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み等の症状があらわれないことを確かめてから使用して下さい。
5. 入浴の1時間前にははがして下さい。はがした直後に入浴すると強い刺激を感じる場合があります。
6. 貼ったまま患部をこたつや電気毛布等で温めないで下さい。
7. 強い刺激を感じた場合にはすぐにはがし、よく泡立てた石鹸でやさしく患部を洗い流して、その後よく冷やして下さい。


【成分及び分量】有効成分 膏体100g(0.455m²)中

成 分	分 量	はたらき
ℓ-メントール	1.0g	知覚神経を軽くマヒさせる
サリチル酸グリコール	2.0g	炎症を抑え痛みをやわらげる
ノニル酸ワニルアミド	0.013g	血行をよくする
ビタミンE酢酸エステル	0.8g	血行をよくする

添加物として酸化チタン、ジブチルヒドロキシルエン、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、二酸化ケイ素、ポリイソブチレン、マクロゴール、流動パラフィン、ロジンエステル、その他1成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
2. 直射日光をさげ、なるべく涼しい所に保管して下さい。
3. 開封後は袋の開封口を折り曲げて保管し、早めに使用して下さい。
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

**【内容量】** 20枚入(1枚サイズ 10cm×7cm)

販売名：トクホンエースホット

【お客様相談室】 ☎ 0120-687-355(受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00
/ 土・日・祝日は除く)製造販売元  **株式会社 トクホン** 〒105-0014 東京都港区芝2-28-8