

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

外用鎮痛消炎プラスター

トクホンフェルビナプラスター

トクホンフェルビナプラスター

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

●してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

- 次の人は使用しないこと
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
 - ぜんそくをおこしたことがある人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 15歳未満の小児
- 次の部位には使用しないこと
 - 目の周囲、粘膜など
 - 湿疹、かぶれ、傷口
 - みずむし・たむしなど又は化膿している患部
- 連続して2週間以上使用しないこと

●相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- 使用后、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、ヒリヒリ感、水疱などの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
まれに下記の重篤な症状がおこることがあるので、その場合は直ちに医師の診療を受けること
- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

【効能又は効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）

【用法及び用量】

15歳以上…薬剤面をおおったライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

15歳未満…使用しないでください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 定められた用法及び用量を厳守してください。
- 本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- 使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状がおきないことを確かめてから使用してください。

【成分及び分量】 有効成分 膏体 100g (0.7m²) 中

成分	分量
フェルピナク	3.5g
l-メントール	3.0g

添加物としてクロタミトン、酸化亜鉛、ジブチルヒドロキシトルエン、ポリイソブチレン、エステルガム、生ゴム、その他2成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 1) 直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
- 2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3) 開封後は保存袋に入れて保管し、早めに使用してください。
- 4) 誤用をさけ、品質を保持するため、付属の保存袋以外の容器に入れかえないでください。
- 5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

大正製薬(株) お客様 119 番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931

発売元 31
大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元
株式会社 トクホン
東京都豊島区高田3丁目26番3号

——本文は、直接外箱に記載されている事項です——