

肌にやさしい
サロパス30[®]



サロパス
第3類医薬品

サロパスについてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。
お客様相談室：☎0120-133250
受付時間：9:00～17:50（土日・祭日・会社休日を除く）

お薬手帳用紙：☎0120-133250
副作用情報等詳細：☎0120-149-931

副作用情報等詳細



うす型 半透明タイプ
サロパス-ハイ[®] 16枚入
サイズ：6.3cm×8.0cm
第3類医薬品

サロパスの
密着浸透力[®]

Hisamitsu[®] 16枚入

Salonpas[®]

サロパス-ハイ[®]



当社従来品に比べて
包装サイズを小さく
しました。

うす型 半透明タイプ

微香性

めだたない



サイズ：6.3cm×8.0cm

セルフメタケーション
税 控除 対象

鎮痛消炎プラスター

第3類医薬品

製造番号 使用期限

サロパス-ハイ[®] 第3類
医薬品

伸び縮みする
サロパス



サロパス-ハイ[®]
第3類医薬品

サロパスの密着浸透力[®]とは、サロパスのフィルムが皮膚に密着し、汗や皮脂などの汚れを除去し、薬液が皮膚に浸透しやすくなることです。そのためサロパスの「密着浸透力」です。



4 987188 115107



第3類医薬品

販売名：サロパス-ハイ[®]

ここを
押し開けて
ください。

ご使用に際して、この説明書を必ずお
読みください。また、必要に応じてすぐ
読めるように大切に保管してください。

Salonpas[®]

特
長

- うす型半透明のフィルムを使用。貼ってもめだちません。
- 微香性なので貼ったままでも安心して外出できます。

詳しい
情報は
こちらへ



▼久光製薬の環境への取り組み
HELLO!eco!プロジェクトの
詳細はこちらへ。
<https://www.hisamitsu.co.jp>

△ 使用上の注意

× してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用
が起こりやすくなります。】

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販
売者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたこ
とがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作
用の可能性がありますので、直ちに使用を中
止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録
販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、 痛み、色素沈着、皮膚はく離

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる
ない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、
薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

● 効能・効果

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、関節
痛、しもやけ

用法・用量

1日数回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監
督のもとに使用させてください。
- (2) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温
めないでください。
- (3) 強い刺激を感じる場合がありますので、入浴
の1時間前には本剤をはがしてください。また、
入浴後は30分位してから使用してください。
- (4) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (5) 皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らない
でください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)

- ℓ-メントール……………7.78g
- サリチル酸グリコール……………5.56g
- ノニル酸ワニルアミド……………0.01g

添加物として、アクリル酸デンプン、ケイ酸Al、水添ロジング
リセリンエステル、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共
重合体、BHT、ポリイソブレン、流動パラフィン、その他1成
分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して
ください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の
原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 開封後は袋の口を折りまげ、箱に入れて保管
してください。