

ご使用の前に、必ずこの説明文書をお読みください。また、必要な時にすぐ読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬
虫さされ・かゆみにしっかりと効きます

第②類医薬品

エコルデEXゲル

特 徴

- ・アンテドラッグ型抗炎症成分（プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル）、かゆみ止め成分（ジフェンヒドラミン塩酸塩）、殺菌成分（イソプロピルメチルフェノール）の3つの効果が虫さされやしつこいかゆみにしっかりと効きます。
- ・メントールとカンフル配合で、スーッとする清涼感がかゆみをすばやく鎮めます。
- ・べたつかない透明なゲルクリームです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の部位には使用しないこと
 - (1)水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
 - (2)創傷面、目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないこと
3. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4)患部が広範囲の人。
 - (5)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

虫さされ、かゆみ、しっしん、皮ふ炎、かぶれ、じんましん、あせも

こんなときに・・・



繊維刺激のカユミ



虫さされによる
カユミ・炎症



カサカサ肌による
カユミ



下着のしめつけに
よるカユミ・かぶれ

用法・用量

- 1 日数回、適量を患部に塗布してください。
- 〈用法・用量に関連する注意〉
- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
 - (2)目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
 - (3)外用にのみ使用すること。

成分・分量（100 g 中）

成 分	含 量	は た ら き
ブドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0.15g	痛みやはれなどの炎症を抑えます
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	かゆみを抑えます
ℓ-メントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみ・炎症を鎮めます
dℓ-カンフル	1.0g	清涼感を与え、炎症を鎮めます
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります
クロタミトン	5.0g	かゆみを抑えます

添加物：ラウロマクロゴール、カルボキシビニルポリマー、ポリアクリル酸ナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、プロピレングリコール、イソプロパノール、エタノール

- 〈成分に関連する注意〉
- 本剤はアルコールを含んでいるので、塗布時にしみることがある。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)火気に近づけないこと。
- (5)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと。
- (6)使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。また、開封後は使用期限内であっても、品質保持の点からなるべく速やかに使用すること。
- (7)本剤は、メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、衣類、プラスチック類、皮製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがあるので、付着しないよう注意すること。

商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局又は下記までお願いいたします。

前田薬品工業株式会社 〒930-0916 富山県富山市向新庄町一丁目18番47号

お客様相談室 電話：076-451-3731(代表) AM9：00～PM5：00（土日祝日を除く）