

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

皮膚疾患外用薬 外用 雪の元

本剤は炎症を鎮め、患部を保護する作用のある酸化亜鉛、かゆみを抑えるジフェンヒドラミン、dl-カンフル、殺菌消毒作用のあるイソプロピルメチルフェノールなど、皮膚疾患に効果的な4種の有効成分を配合していますので、しっしん、ただれなど幅広い疾患に効果的です。



使用上の注意

相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

《効能・効果》

かゆみ、かぶれ、皮膚炎、じんましん、ただれ、しっしん、しもやけ、あせも、ひび

《用法・用量》

患部を清潔にしたのち、1日2～3回適量をすりこんでください。
又は症状に応じてガーゼに適量を塗布して患部に貼付してください。

《用法及び用量に関連する注意》


- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

《成分・分量》(100 g)中

成 分	分 量	働 き
酸化亜鉛	10.0 g	炎症を鎮め、患部を保護する
ジフェンヒドラミン	1.0 g	かゆみを抑える
イソプロピルメチルフェノール(ビオゾール)	1.0 g	殺菌作用により、患部の化膿を防ぐ
d1-カンフル	2.25g	清涼感を与え、かゆみを抑える
添加物：d-ボルネオール、バレイシヨデンプン、ワセリン、パラフィン、香料		

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。



本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地

株式会社 雪の元本店 お客様相談室

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土曜、日曜、祝日を除く)

TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 株式会社 **雪の元本店**

奈良県橿原市大谷町182番地

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4) 期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。
〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地
株式会社 雪の元本店 お客様相談室
受付 9:00~12:00 TEL 0744-22-2440
時間 13:00~17:00 (土曜、日曜、祝日を除く) FAX 0744-22-2406

製造販売元

株式会社 **雪の元本店**
奈良県橿原市大谷町182番地
20g入

2005-MRS

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

第3類医薬品

TRADE MARK



抗ヒスタミン剤配合
皮膚疾患外用薬



金 属：缶

相談すること **使用上の注意**

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

効能・効果

かぶれ、じんましん、かゆみ、しっしん、ただれ、しもやけ、皮膚炎、あせも、ひび

用法・用量

患部を清潔にしたのち、1日2~3回適量をすりこんでください。又は、症状に応じてガーゼに適量を塗布して患部に貼付してください。

用法及び用量に関連する注意

(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分・分量及びはたらき 100g中

成分	分量	はたらき
酸化亜鉛	10.0g	炎症を鎮め、患部を保護
ジフェンヒドรามミン	1.0g	かゆみを抑える
イソプロピルメチルフェーノール	1.0g	殺菌作用
dI-カンフル	2,25g	かゆみを抑える
添加物として、バレイシヨデンブ、ワセリン、パラフィン、d-ボルネオール、香料を含有する		