

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

第3類医薬品

日本薬局方
サンシシ末

サンシシ末は、アカネ科クチナシの成熟果実を乾燥し粉末にしたものです。

⚠ 使用上の注意



【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口



【相談すること】

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

うちみ、ねんざ

用法・用量

若干のコムギ粉と混ぜ、水で練って外用とする

<用法・用量に関連する注意>

1. 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
2. 目に入らないように注意してください。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合は眼科医の診療を受けてください。
3. 外用にのみ使用してください。

成分・分量

1日量(1g)中 日本薬局方 サンシシ末 1g

保管および取扱上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わる)

※ 本品は生薬の粉末ですので、製品により粉末の色調が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

お客様相談窓口

本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

製造販売元:株式会社 延寿堂(えんじゅどう)

〒930-0813 富山県富山市下赤江町1-13-3

電話:076-431-7017 FAX:076-431-7013

受付時間:午前9:00から午後4:30まで(土、日、祝日を除く)