

ご使用に際してこの添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保管してください。



メディッド クール

治療薬スプレー
〈エアゾール〉

日焼け後の
ほてり・いたみに

かぶれ…
かゆみ・皮ふ炎に

あせも…
かゆみ・湿疹に

(販売名) 近江兄弟社メンタームメディッドクールスプレー
非ステロイド性抗炎症剤

- 抗炎症剤「ブフェキサマク」が、日焼けによる痛み・ほてり、炎症を鎮めます。
- 抗炎症剤「グリチルレチン酸」が、患部の炎症を鎮め、治癒を促進します。
- 背中など塗りにくい患部にも直接噴射することができます。
- パウダー入りですので、ベタつかずサラッとした使用感です。

【使用上の注意】

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目や目の周囲、粘膜 (例えば、口腔、鼻腔、膣など)
 - (2) ひどい日焼けや水ぶくれになっている患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状をおこしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 患部が化膿している人
 - (6) 患部の湿潤やただれがひどい人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感(ヒリヒリ感)、しみ、皮ふの乾燥化

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
接触皮膚炎	塗布部に発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ等があらわれ、これらの症状が全身に広がり、重症化することがある。

- (2) 5~6日間使用しても症状の改善が見られない場合

【効能・効果】

日焼けに伴うほてり・いたみ・かゆみ、湿疹、皮ふ炎、かゆみ、かぶれ、ただれ、あせも

【用法・用量】

1日数回患部に適量を噴射塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合はすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。尚、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 使用前によく振ってください。
- (7) 患部まで約10cmの距離で噴射してください。
- (8) 同じ箇所を連続して3秒以上噴射しないでください。
- (9) 逆さまや横向きにして使用しないでください。

【成分・分量】

成分	1本(70g)中含量	はたらき
ブフェキサマク	0.7g (原液1g中：25mg)	(抗炎症剤) 日焼けによる痛み・ほてり、炎症を鎮めます。
グリチルレチン酸	0.14g (原液1g中：5mg)	(抗炎症剤) 患部の炎症を鎮め、治癒を促進します。

添加物として、エタノール、2-エチルヘキサン酸セチル、ラウロマクロゴール、二酸化ケイ素、メチルパラベン、キシリタンガム、LPGを含有する。

<保管及び取扱い上の注意>

- (1) 直射日光を避け、涼しいところにキャップをしめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 火気に近づけないでください。
- (4) 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たるところやストーブ、ファンヒーター等の近くなど温度が40度以上となるとところに置かないでください。
- (5) 炎や火気の近くで使用しないでください。
- (6) 火気を使用している室内で大量に使用しないでください。
- (7) 火の中に入れてください。
- (8) 使い切って捨ててください。
- (9) 捨てるときには、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを抜いてください。
- (10) 水まわりや湿気の多い場所では、缶がサビて穴があき、破裂することがあるので、置かないでください。