

この説明書は、お薬とともに保管し、使用の際にはよくお読みください。

第3類医薬品

A・COOP クミアイ
コリトン「エス」

鎮痛消炎薬

特 徴

- 打撲やねんざなどの急性の症状に特に効果的な冷感タイプの貼り薬です。
- すぐれた消炎・鎮痛効果をあらわすとともに、血行を促進し、治りを早めます。
- 粘着性にすぐれ、患部にフィットします。



使用上の注意

してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）
次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

肩のこり・腰の痛み・
神経痛・ロイマチス・
打身・ねんざ・筋肉痛・
関節痛・頭痛・歯痛



用法・用量

用に臨み患部に貼用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 貼る前に、皮膚の水分や汗をよくふき取ってください。
- (3) 貼りかえるときには、なるべく前に貼ったところから少しずらして貼ってください。

成分・分量 5,100cm² (膏体100g)中

成分	含量	はたらき
ℓ-メントール	6.0g	さわやかな清涼感により局所を刺激し、知覚を軽く麻痺させて痛みをしずめます。
dℓ-カンフル	1.0g	
d-ボルネオール	1.0g	
サリチル酸メチル	4.5g	鎮痛効果をあらわすとともに、腫れや炎症をしずめます。
酸化亜鉛	19.0g	局所を保護して、炎症やかぶれを防ぎます。
チモール	0.5g	局所の殺菌薬として作用します。

添加物として、生ゴム、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ポリブテン、エステルガム、脂肪族炭化水素樹脂、BHTを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口 ☎ 0238(46)2013
月～金曜日 9:00～17:00 (祝日を除く)

販売者 **全国農業協同組合連合会**
東京都千代田区大手町1-3-1

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930