

【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日4回を限度として適量を患部に塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 11歳以上の小児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 11歳未満の小児には使用させないでください。(3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。(5) 1週間当たり50mLを超えて使用しないでください。(6) 薬剤塗布後の患部をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないでください。(7) 定められた用法・用量をお守りください。

RAKOOL

第2類医薬品

ラクール 経皮吸収型消炎鎮痛剤

インペタン 大容量
1%液 100mL

広範囲に塗りやすい大型ヘッド液剤



※
大型
ヘッド

インドメタシン 1% 製剤

首曲がり容器



※ラバー面積約2倍(当社比)

【成分・分量】100g中

インドメタシン…… 1,000mg
 0-メントール…… 3,000mg
 添加物：ポリオキシエチレン
 硬化ヒマシ油、インプロパノール、
 エドテ酸Na水和物、オキシベンゾン、
 ミリスチン酸イソプロピル、
 ベンジルアルコール、
 ヒドロキシプロピルセルロース、
 グリセリン、
 チオ硫酸Na水和物、
 1,3-ブチレングリコール

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。(5) 火気に近づけないでください。(6) 使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

発売元
ラクール薬品販売株式会社
 東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆
 フリーダイヤル 0120-86-8998

製造販売元
三友薬品株式会社
 東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

ここから
 開けてください

第2類医薬品

販売名 インペタン1%液

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください
 - (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし、むし等または化膿している患部。
3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931



製造
 番号

使用
 期限