

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品 消炎・鎮痛冷感パップ剤

1枚:10×14cm (8枚×4袋)  
**エクトペインSクール 32枚入**

特長

腫れや熱感を伴う打撲、ねんざなどの急性炎症に適しています。膏体中に含まれる水による冷シップ作用により、患部を冷やしながら有効成分の消炎・鎮痛効果をあらわします。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) しっしん、かぶれ、傷口。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

#### ※帯状疱疹

本剤の使用中に痛みをとまなう赤味を帯びた米粒大の水疱があらわれた場合には、ウイルスによる帯状疱疹であることが多く、副作用と間違えられることがあります。このような場合には使用を中止して、皮膚科専門医の診療を受けてください。

販売名 エクトペインSクール

製造番号

使用期限

# 腰痛・ねんざ 打ち身・筋肉痛

▼実物大 (10cm×14cm)

#### ● 成分・分量

膏体100g中

成 分	含 量	働 き
サリチル酸メチル	0.5g	腫れや熱感などの炎症を鎮め、痛みを抑えます
dℓ-カンフル	0.5g	清涼感による刺激と軽い知覚麻痺で痛みを抑えます
ℓ-メントール	0.3g	

添加物として、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、カルボキシビニルポリマー、ポリアクリル酸部分中和物、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、セスキオレイン酸ソルビタン、ポリソルベート80、ケイ酸アルミン酸Mg、カオリン、酸化チタン、エデト酸Na水和物、パラベンを含有します。

#### ● 効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

#### ● 用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがして、1日1～2回患部に貼付してください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいている時は、よくふきとってからお貼りください。
- (4) 患部の広さに応じて、フィルムの上から適当な大きさにハサミで切ってご使用ください。

#### ● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

＜副作用被害救済制度のお問い合わせ先＞

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

フリーダイヤル 0120-149-931

＜お問い合わせ先＞

本製品に関するお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。  
三友薬品株式会社 03-3899-9333

この紙を押して  
開けてください。



発売元  
東光クリエート株式会社  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号



製造販売元  
三友薬品株式会社  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

