

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また必要な時に読めるよう大切に保管してください。

外用非ステロイド性消炎・鎮痛剤

新テイクリーム®ID 1%

新テイジェル®ID 1%

(インドメタシン含有製剤)

第2類医薬品



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

用法・用量

1日4回を限度として適量を患部に塗擦する。

(裏面もご覧ください)

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)11歳未満の小児に使用させないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5)1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (6)薬剤塗擦後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

成分・分量（100g中）

販売名	新テイクリームID1%	新テイジェルID1%
成分・分量	インドメタシン……………1.0g (1.0%) ℓ-メントール……………3.0g (3.0%)	
添加物	ポリオキシエチレンセチルエーテル、モノステアリン酸グリセリン、軽質流動パラフィン、濃グリセリン、カルボキシビニルポリマー、パラオキシ安息香酸メチル、チオ硫酸ナトリウム水和物、ジブチルヒドロキシトルエン、トリエタノールアミン	プロピレングリコール、ラウロマクロゴール、ベンジルアルコール、クロタミトン、エタノール、パラオキシ安息香酸メチル、エデト酸ナトリウム水和物、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4)火気に近づけないでください。（新テイジェルID1%のみ）
- (5)本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- (6)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。また開封後は使用期限内であっても、品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。
- (7)本剤が衣類や寝具などに付着すると黄色く着色することがあるので、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落としてください。（有効成分インドメタシンによる着色）
- (8)本剤がメガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や寝具などの塗装面等に付着すると変質することがあるので、付着しないように注意してください。（新テイジェルID1%のみ）

包装：新テイクリームID1% 50g×20・25g×40

新テイジェルID1% 50g×20・25g×40

本品についてのお問い合わせは、下記までご連絡下さい。
テイクファルマケア株式会社 電話(0879)25-7771
香川県東かがわ市三本松567番地
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日除く)

副作用救済制度0120(149)931

発売元

テイクファルマケア株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元

新新薬品工業株式会社

富山県富山市今市324番地