

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

日本標準商品分類番号

872646

第②類医薬品

かゆい湿疹、虫さされに

かゆケア

外用湿疹・皮ふ炎用薬

特徴

本剤は、4つの有効成分のはたらきで、かゆみ、湿疹、虫さされ等にすぐれた効果をあらわす外用湿疹・皮ふ炎用薬です。本剤の主成分であるプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルは、皮ふ表面の患部ですぐれた効果をあらわし、体内に吸収されると代謝されて活性が低くなるという特性をもつ、アンテドラッグとよばれるタイプのステロイド剤です。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1)水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
 - (2)目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4)患部が広範囲の人。
 - (5)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

■ 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。
- (4)定められた用法・用量を守ってください。
- (5)本剤を塗擦後、その部位をラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。

■ 成分・分量

成分名	分量 (1g中)	はたらき
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	1.5mg	アンテドラッグ。抗炎症作用により、皮膚のかゆみ、炎症を抑えます。
クロタミトン	50.0mg	かゆみを抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	5.0mg	血行を促進し、治療を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	1.0mg	殺菌効果により、患部の感染を防ぎます。

●添加物として、ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、グリセリン、パラベン、カルボキシビニルポリマー、水酸化Na、塩酸を含有します。

本剤は、有効成分による特有のにおいを有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

■ 包装 15g**〈製品情報問い合わせ先〉**

くすり相談室 ☎ 0120-841-704
104-8002 東京都中央区京橋 2-4-16 (Meiji Seika ファルマ株式会社)
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

〈副作用被害救済制度の問い合わせ先〉

(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発売元

株式会社 明治

136-8908 東京都江東区新砂1-2-10

製造販売元

新 生 薬 品 株 式 会 社

富山県中新川郡上市町横越16番1