

※2013年10月改訂（効能・効果 ただれ削除に伴う改訂）

2013年10月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

ヒフワン軟膏

第②類医薬品

- ・ヒフワン軟膏はすぐれた抗炎症作用があり、患部で良く効いて、体の中で低活性物質に変わる、従来のステロイド外用薬とは異なる製剤です。
- ・医療用薬剤から大衆用薬に転用された、安全性と有効性の両立を目的とされた「アンテドラッグ」の性質を持った外用剤です。
- ・のびの良いゲル状の油脂性基剤ですので、ソフトな使用感の軟膏です。
- ・軟膏の硬さは、夏冬の気温差に関係なく一定し、快い使用感です。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の部位には使用しないでください
水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、 化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

※効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

用法・用量

通常1日1～数回適量を患部に塗布してください。なお、症状により適宜増減してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用してください。

成分・分量

成分	100g中 分量
ヒドロコルチゾン酪酸エステル	0.05g

添加物としてゲル化炭化水素を含有します。

保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)開封時に、基剤の一部が液状となってわずかに流れ出ることがありますが、品質の劣化ではありませんので、そのままご使用ください。
- (5)使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

発売元 **ノイテ** 薬品株式会社 大阪府松原市高見の里4丁目8番16号
お客様相談室 072-331-0417
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

発売元
ノイテ 薬品株式会社
大阪府松原市高見の里4丁目8番16号

製造販売元
新生薬品工業株式会社
富山県中新川郡上市町三日市22番地