

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

新デキサP軟膏

第②類医薬品

新デキサP軟膏は親水性の基剤にすぐれた消炎・鎮痒作用を有するデキサメタゾン酢酸エステル、局所麻酔作用を有するジブカイン塩酸塩、殺菌・消毒作用を有するイソプロピルメチルフェノールを配合した外用薬です。

△ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

- 次の部位には使用しないでください
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
(2)目や目の周囲。
- 顔面には、広範囲に使用しないでください
- 長期連用しないでください

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)患部が広範囲の人。
(5)湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状 |
|--------|-------------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 皮膚(患部) | みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感 |

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

※効能・効果

濕疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回適量を患部に塗擦する。

（用法・用量に関連する注意）

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。
- 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。

成分・分量

100g中

| 成分 | 分量 |
|----------------|--------|
| デキサメタゾン酢酸エステル | 0.025g |
| ジブカイン塩酸塩 | 0.200g |
| イソプロピルメチルフェノール | 0.100g |

添加物としてソルビタン脂肪酸エステル、セタノール、流動パラフィン、プロピレングリコール、ラウリル硫酸Na、ポリソルベート60、エデト酸Na、ピロ亜硫酸Na、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- 使用期限（ケースに記載）を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にご連絡下さい。
新生薬品工業株式会社
電話：076-472-0380
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土、日、祝日を除く）