

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

肩こりに伴う痛み、
筋肉痛、腰痛などに

プロナタンゼリー

外用鎮痛消炎薬

特徴

- フェニル酢酸系の非ステロイド消炎鎮痛成分「フェルピナク」が、皮膚から炎症部位に浸透し、作用します。
- 「フェルピナク」は、患部で痛みや炎症に関係する物質（プロスタグランジン）の産生を抑えることにより、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛などの痛みや炎症に効果を現します。
- ゲル状の基剤を使用しているため、なめらかでのびが良く、患部に浸透しやすく、塗ったあともべとつきません。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4)15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。
- (3)化膿している患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

- (2)1週間位使用しても症状がよくなる場合

成分・分量 100g中

成 分	分 量
フェルピナク	3.0g

添加物として、プロピレングリコール、ジイソプロパノールアミン、エタノール、香料、その他2成分を含有します。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）

用法・用量


1日2～4回、適量を患部に塗擦すること。

（用法・用量に関連する注意）

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)ラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。

※チューブ穴の開け方

(右図を参照してください。)
キャップを逆にして、キャップの突起部をチューブの先に強く押し当てます。



保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべく速やかにご使用ください。

包装

50g

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は右記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

発売元

日邦薬品工業株式会社 東京都渋谷区代々木3-46-16
お客様相談室 TEL 03(3370)7174(代表)
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

販売元 **興亜製薬株式会社**
横浜市港北区箕輪町2-17-5

製造販売元 **新生薬品工業株式会社**
富山県中新川郡上市町三日市22番地