

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

バイパークロンゼリー

第2類医薬品

外用鎮痛消炎薬

特徴

- 非ステロイド性の消炎鎮痛成分フェルピナクが、皮膚から直接炎症を起こした部位に浸透し、効果を発揮します。
- 消炎鎮痛成分フェルピナクは、患部で痛みや腫れに関係する物質（プロスタグランジン）の産生を抑え、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛などによく効きます。
- なめらかで、のびがよい基材ですので、塗りやすく、すりこみやすいゲル状の軟膏です。
- 透明なので衣服に色がつきません。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないで下さい。
 - (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4)15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないで下さい。
 - (1)目の周囲、粘膜等。
 - (2)湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3)化膿している患部。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1)使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

- (2)1週間位使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）

用法・用量

1日2～4回、適量を患部に塗擦すること。

(用法・用量に関連する注意)

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流して下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (3)ラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないで下さい。
- (4)外用にのみ使用して下さい。
- (5)患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。

成分・分量

100g中

成 分	含 量
フェルピナク	3.0g

添加物として、プロピレングリコール、ジイソプロパノールアミン、エタノール、香料、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)火気に近づけないで下さい。
- (5)使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、開封後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべく速やかに使用して下さい。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 0120-468771

受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **協和薬品工業株式会社**
営業本部：岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号
本社：東京都世田谷区上相師谷1丁目11番3号

製造販売元 **新生薬品工業株式会社**
富山県中新川郡上市町三日市22番地