

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痒消炎薬

第②類医薬品

新ダイアコーチノンS

新ダイアコーチノンSは、皮膚の炎症をしずめる作用のすぐれた合成副腎皮質ホルモン・コルチゾン酢酸エステルに局所麻酔作用を有するジブカイン塩酸塩、消炎作用を有するグリチルレチン酸、殺菌作用を有するイソプロピルメチルフェノールを配合した鎮痒消炎の外皮用薬です。

⚠️ ご使用上の注意

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の部位には使用しないで下さい
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
 2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい
 3. 長期連用しないで下さい

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるの
ので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量

通常1日1～数回適量を患部に塗布する。なお、症状により適宜増減する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流して下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4)本剤は外用にのみ使用して下さい。
- (5)患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。

成分・分量

100g中

成分	分量
コルチゾン酢酸エステル	0.25g
グリチルレチン酸	0.30g
ジブカイン塩酸塩	0.10g
イソプロピルメチルフェノール	0.10g

添加物としてセタノール、流動パラフィン、プロピレングリコール、ポリソルベート60、ラウリル硫酸Na、BHT、ソルビタン脂肪酸エステルその他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)配置期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、配置期限内であっても、開封後はなるべく早く使用して下さい。

お問合せ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの配置販売業者又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社浅田館 お客様相談室

電話 03-3953-4044 時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)