

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痒消炎薬 **ワルタームC**

第2類医薬品

クールタームCはさわやかな清涼感のあるかゆみ用の外用軟膏です。かゆいと神経がイライラし、患部を爪で引っかけて化膿をおこしたりします。ですから軽く考えずかゆみを早くとらなければなりません。このようなときクールタームCは効果を発揮します。クールタームCは局所消炎作用を有するL-メントール、局所消炎・鎮痒作用を有するdl-カンフル、局所麻酔作用を有するリドカイン、抗ヒスタミン剤のジフェンヒドラミンを配合した透明なゼリー剤です。

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

かぶれ、湿しん、じんましん、皮膚炎、あせも、しもやけ、虫さされ、かゆみ、ただれ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流して下さい。なお、症状が重い場合には、眼科専門医の診療を受けて下さい。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服しないで下さい。
- 患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。

成分・分量

100g中

成分	分量
L-メントール	4.00g
dl-カンフル	3.00g
リドカイン	2.00g
ジフェンヒドラミン	1.00g

添加物として、トリアソプロパノールアミン、プロピレングリコール、エタノール、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用して下さい。
- 本剤は揮発性ですので、キャップをあけて放置するとチューブの口の部分が白くなる場合があります。白くなくても効果に変わりはありませんが、使用後は密栓して下さい。
- 火気に近づけないで下さい。
- アルコールなどにとけるおそれのあるもの(めがねのわく、塗装家具など)にはつかないようして下さい。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡下さい。

日本ゼトック株式会社 ☎0120-886-440

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **日本ゼトック株式会社**
東京都新宿区西新宿1-26-2