

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ひどい虫さされ・しぶといかゆみに



第Ⅱ類医薬品

〈販売名〉近江兄弟社メンタームペンソールDX
鎮痒消炎薬

●ひどい虫さされやしぶといかゆみをすばやく抑えます。

●アンテドラッグステロイド剤、PVA配合。

※1

△[使用上の注意]

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
(1) 水痘（水ぼうそう）、水虫・たむし等又は化膿している患部。
(2) 創傷面、目の周囲、粘膜等。
2. 長期連用しないでください。
3. 本剤はステロイド成分※2（副腎皮質ホルモン剤）ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルを含んでおり、顔面に広範囲又は長期間（2週間以上）塗布すると赤ら顔のようになることがありますので、顔面に続けて長く使用しないでください。

⚑ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
(6) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、はれ、かゆみ
皮ふ(患部)	水虫・たむし等の白斑症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、発疹

- (2) 5~6日間使用しても症状の改善が見られない場合。

【効能・効果】虫さされ、かゆみ、しつしん、皮ふ炎、かぶれ、じんましん、あせも

【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) キャップをとりはずし、スポンジ部分を肌に1~2回軽く押し当てて、スポンジに薬液をしみ込ませてからご使用ください。
- (2) 定められた用法、用量を守ってください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 本剤は外用にのみ使用してください。

【成分・分量】100mL 中に次の成分を含みます。

成 分	分 量	働 き
ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル (アンテドラッグステロイド剤)	0.15g	しつしん、じんましん等の炎症を抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	虫さされ等に伴うかゆみを抑えます。
1-メントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみをしめます。
dl-カンフル	1.0g	清涼感を与え、かゆみをしめます。
インプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。

添加物として、エタノール、1,3-ブチレンギコール、ジブチルヒドロキシトルエンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 使用後は必ずキャップを十分にしめてください。
- (2) 高温・直射日光を避け、涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリー、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (7) 本剤のついた手で目等の粘膜にふれないでください。
- (8) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

※1 … PVA(ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル)とは

ベンソールDXに配合されているPVA(ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル)は皮ふ表面の患部でしっかり効果を発揮した後、体内に吸収されると低活性となり、ステロイド特有の副作用を起こしにくい特性を持つアンテドラッグ型のステロイド剤です。

※2 … ステロイド成分について

ステロイド成分は、虫さされ等によるアレルギー性の炎症を抑え、主にかゆみの長期化と悪化の回避に有効にはたらきます。特にぶりかえすしつこいかゆみには、ステロイド成分が適しています。ステロイド成分による副作用は、長期間継続使用した場合、皮ふが薄い顔や首等にあらわれやすく、顔の場合は赤ら顔になることがあります。症状の改善とともに徐々に減量・中止するようにしてください。同じ部位に継続して使う場合は、顔には2週間以内、その他の部位は4週間以内を目安にしてください。早めに使って早めに治すことが、ステロイド成分配合剤の上手な使い方です。

★虫さされの症状がきわめてひどい場合や患部が広範囲な時は、ベンソールDXで対処できないことがありますので、早めに医師の手当てを受けてください。

★ハチに刺された場合は、激しい灼熱痛を伴います。ベンソールDXでは対処できません。一刻も早く医師の手当てを受けてください。

【包装】40mL

お問い合わせ先

株式会社 近江兄弟社 お客様相談室

TEL. 0748-32-3135

受付時間：午前 8：30 から午後 5：30 まで
(土、日、祝日を除く)

発 売 元 株式会社 近江兄弟社

滋賀県近江八幡市魚屋町元29

製造販売元 万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142

①122008