

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 外用鎮痛消炎薬

【販売名】

# アイン<sup>®</sup>FE液

第2類医薬品

### ■特徴

- アイン<sup>®</sup>FE液は、痛みや腫れのもとに直接作用するフェルピナクを3.0%配合した非ステロイド系の鎮痛消炎薬です。
- フェルピナクは、患部で痛みや腫れに関係する物質(プロスタグランジン)の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉の痛みにすぐれた効き目をあらわします。
- 背中・腰などの手の届きにくいところにも塗りやすい容器で、痛みの強い部位にもやさしく塗れます。
- 1-メントール3.0%配合により、塗布後心地よい清涼感があります。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないで下さい。  
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2)ぜんそくを起こしたことがある人。  
(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(4)15才未満の小児。
2. 次の部位には使用しないで下さい。  
(1)目の周囲、粘膜等。  
(2)湿疹、かぶれ、傷口。  
(3)化膿している患部。



### ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。  
(1)使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

- (2) 1週間位使用しても症状がよくなる場合。

## 【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）

## 【用法・用量】

1日2～4回、適量を患部に塗布して下さい。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)15才未満の小児に使用させないで下さい。
- (2)定められた用法を守って下さい。
- (3)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けて下さい。
- (4)外用にのみ使用して下さい。
- (5)薬剤塗布後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないで下さい。

## 【成分・分量】（100mL中）

成分	分量	はたらき
フェルピナク	3.0g	炎症を抑え痛みをやわらげます
l-メントール	3.0g	清涼感を与え、痛みをやわらげます

添加物として、ヒプロメロース、ジブチルヒドロキシトルエン、ジイソプロパノールアミン、グリチルレチン酸、マクロゴール400、クエン酸水和物、エタノールを含有する

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4)本剤を火気に近づけないで下さい。また、使用後は火中に投じないで下さい。
- (5)揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかりと締めて下さい。
- (6)メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意して下さい。
- (7)使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用して下さい。

### 〔内容量〕

80mL

### 火気厳禁

第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ  
(エタノール、ジイソプロパノールアミン)

製品のお問い合わせ先  
万協製薬株式会社  
電話 0598-37-2088  
受付時間 AM10:00～PM5:00  
(ただし、土、日、祝日を除きます。)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎0120-149-931 (フリーダイヤル)

発売元 **小林薬品工業株式会社**  
東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

製造販売元 **万協製薬株式会社**  
三重県多気郡多気町五柱1169-142